



AGRIA TEELTADVIES OOGST 2021

De eigenschappen

	Agria	Bintje
Vroegrijpheid	5	6,5
Schilkleur	geel	geel
Vleeskleur	geel	lichtgeel
Knolvorm	lang	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	7,5	7
Aantal knollen	7-10	14-17
Grootte knollen	8,5	7
Sortering	7,5	7
Opbrengst	110	105
Drogestof	93	102
Kiemrust	7,5	5,5
Loofontwikkeling	traag	snel
Loofeigenschap	robuust	normaal
	lang	
Phytophthora loof	5,5	3
Phytophthora knol	7	4,5
Aardappelmoetheid	Am A	vatbaar
Schurft	4	5

Het planten

Pootgoedsoortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
35/50 mm	25 - 30 cm	3.200 kg
<p>Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.</p> <p>Op de zwaardere gronden de kleinste plantafstand aanhouden. Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.</p> <p>De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten. Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!</p>		

De bemesting

Stikstof	Totaal +/- 200-225 kg per ha <u>incl. bodemvoorraad</u> . Late overbemesting wordt afgeraden. Pas op voor percelen waar in het verleden veel organische mest gebruikt is, houd daar rekening met stikstofgift i.v.m. onderwatergewicht.
Fosfaat	Volgens bodemonderzoek.
Kali	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten i.v.m. onderwatergewicht. Verse chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m. de blauwgevoeligheid. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.
Mangaan	Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen.
+	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

De gewasbescherming

- Agria verdraagt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.
- Alternaria bestrijding is zeer aan te bevelen met 2 x 0.25ltr Amistar (overleg met uw adviseur)

De oogst en bewaring

- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.
 - Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
 - Na inschuren de partij zo snel mogelijk droogblazen en vervolgens droog houden, partij zeer regelmatig blijven controleren op rot.
 - Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
 - Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.
 - Poedervormige kiemremmingmiddelen kunnen gebruikt worden indien product voldoende afgehard is.
- Bewaartemperatuur:
- | | | |
|--------------------|-----|----|
| levering jan / feb | 8,0 | °C |
| levering mrt | 7,0 | °C |
| levering apr / mei | 7,0 | °C |
| levering juni | 7,0 | °C |

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!