



MARKIES TEELTADVIES OOGST 2021

De eigenschappen

	Markies	Bintje
Vroegrijpheid	4	6,5
Schilkleur	geel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	lang ovaal	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	7,5	7
Aantal knollen	9-12	14-17
Grootte knollen	8	7
Sortering	7,5	7
Opbrengst	110	100
Drogestof	105	102
Kiemrust	8	5,5
Loofontwikkeling	traag	snel
Loofeigenschap	robuust	normaal
Phytophthora loof	7	3
Phytophthora knol	7	4,5
Aardappelmoetheid	Am A	vatbaar
Schurft	5	5

Het planten

Pootgoedsoortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
35/45 mm	34 - 37 cm	2.000 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg. Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

Markies heeft een vrij lange kiemrust, om de beginontwikkeling te bevorderen loont het om de poters voor het poten te laten acclimatiseren en goed los te laten komen.

De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten.
Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!

De bemesting

Stikstof	Totaal +/- 250 kg per ha <u>incl. bodemvoorraad</u> . 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 na de knolzetting
Fosfaat	Volgens bodemonderzoek.
Kali	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten i.v.m. onderwatergewicht. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.
Mangaan	Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen.
+ Magnesium	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

De gewasbescherming

- Markies verdraagt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding, vanaf 80% opkomst. Daarna een strak schema hanteren.
- Alternaria bestrijding **is zeer aan te bevelen.**

De oogst en bewaring

- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.
 - Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
 - Na inschuren de partij zo snel mogelijk droogblazen en vervolgens droog houden, partij zeer regelmatig blijven controleren op rot.
 - Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
 - Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.
 - Vloeibare kiemremmers kunnen gebruikt worden indien product voldoende afgehard is. Maar de voorkeur gaat duidelijk uit naar alleen gassen. Begin met gassen zsm na de wondheling. Doorgaans 3-4 wk. na inschuren.
- Bewaartemperatuur:
- | | | |
|--------------------|-----|----|
| levering jan / feb | 8,0 | °C |
| levering mrt | 7,0 | °C |
| levering apr / mei | 7,0 | °C |
| levering juni | 7,0 | °C |

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!